

چشم‌ها قسمت بزرگی از صورت بدن شمرده می‌شوند. آن‌ها هیجان‌ات، شادی، غم و ترس را بیان می‌کنند. پوست، بافت، عضله، چربی، مو و مژه اطراف چشم بیان ما را هدایت می‌کند. چروک‌ها و خطوط عمیق به اندازه پف‌کردگی پلک با گذشت زمان شروع می‌شود. خورشید و زمینه ژنتیکی نیز می‌تواند یک فاکتور کمک‌کننده باشد، در نتیجه باعث حالت خستگی یا مستتر به نظر رسیدن صورت شود. امروزه چندین تکنیک جراحی شامل جراحی پلک و لیفت ابرو وجود دارد. بلغاروپلاستی می‌تواند انحناهای پلک‌ها، کیسه زیر چشم‌ها را تصحیح و نیز چین‌اطراف چشم‌ها را افزایش دهد. این پروسیجر شامل برداشتن پوست و چربی اضافه بالا و پائین پلک‌ها است و اغلب با لیفت ابرو و پیشانی و یا لیفت صورت انجام می‌شود. لیفت ابرو و پیشانی برای بالا کشیدن ابرو و کاهش شیارهای پیشانی انجام می‌شود. بنابراین ظاهر را جوانتر می‌کند.

قبل از جراحی:

معاینه پوست اضافی که باید برداشته شود انجام می‌شود. پزشک نتیجه‌ای که قابل انتظار است و مشکلات و خطرات ممکن را شرح می‌دهد. قبل از جراحی داروهایی که حاوی اسپرین است برای به حداقل رساندن امکان خونریزی حذف می‌شود. ممکن است چند روز قبل از جراحی آنتی‌بیوتیک توصیه شود.

پروسیجر جراحی پلک:

تحت بیحسی موضعی یا بیهوشی عمومی صورت می‌گیرد. جراح خطوط و چین‌های طبیعی را دنبال می‌کند و برش خیلی کوچکی از داخل به خارج لبه پلک ایجاد می‌کند. روی پلک پائین برش به طرز مستقیم زیر مژه‌ها زده می‌شود. سپس چربی اضافه و پوست از قسمت‌های زیرین برداشته می‌شود. برش پلک بالا در چین پلک ایجاد می‌شود. سپس بخیه‌های کوچک زده و در صورت لزوم پانسمان می‌شود. این کار 2-3 ساعت زمان می‌برد که بسته به وسعت جراحی ممکن است طولانی‌تر شود.