

گونه

تغییرات وزن، شایعترین عامل بروز تغییرات در شکل گونه می باشد. افتادگی و کوچک شدن گونه ها نتیجه آن می باشد. محل گونه در صورت در حقیقت محل استخوانی سطح قدامی سینوس ماگزیلاری که حفره تو خالی در استخوان فک فوقانی می باشد، هست. اگر صدماتی در اثر ضربه یا بدخیمی ها ایجاد شود ممکنست ضرورت دخالت جراحی جهت ترمیم نواقص ایجاد شده را ایجاب کند. در حال حاضر پروتزهایی خاص جهت ترمیم نقایص و صدمات استخوانی گونه که از جنس فلزاتی مانند تیتانیوم میباشد، وجود دارد. ولی امروزه اکثر تغییرات گونه جنبه زیبایی هم پیدا کرده است که از پرکننده ها یی مثل ژل هیالورونیک اسید، چربی خود فرد بصورت پیوند اتوگرافت استفاده کرد. علاوه بر موارد ذکر شده از پروتز دائمی نیز میشود استفاده نمود. هر کدام از موارد معایب و محاسنی دارد. کاربرد ژل در موارد استفا ده کوتاه مدت مفید است. تزریق چربی بدلیل جذب ممکن است در چند مرحله انجام شود. هر چند با چاق و لاغر شدن فرد اندازه گونه گرافت شده هم تغییر میکند ولی دائمی محسوب میشود. استفاده از پروتز گونه با توجه به مد نظر قرار دادن فاکتورهای مختلف شاید در کل گزینه بهتری باشد. اندازه های متفاوتی دارد و از مواد کم حساسیت زا و قابل انعطاف تشکیل شده و قابلیت جذب و تغییر اندازه دادن با گذشت زمان ندارد و شکل آناتومیک آن باعث حداکثر قرینه گی و رضایتمندی می شود. معمولا با بیهوشی عمومی و از داخل دهان در یک جلسه در مدت زمان حدود یک ساعت قابل انجام است. از روی صورت آثار جراحی ندارد. دوره نقاهت آن حدود کمتر از یک هفته است. لازم است بدانیم در مواردی از مشکلات گونه ممکن است اندازه و شکل بینی دخالت داشته باشد که مشاوره حضوری، و در صورت ضرورت جراحی انتخاب روش عمل، بسیار کمک کننده میباشد.